Fusidex

Acido Fusídico

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR.

Antibiótico tópico.

COMPOSICIÓN
Cada 100 g de crema contiene:
Ácido Fusídico al 2%
Excipientes c.s.

DESCRIPCIÓN
Es un agente antibacteriano de uso tópico indicado en infecciones de piel (abscesos, acné y celulitis) con actividad bacteriostática y bactericida principalmente contra cocos Gram (+).
Mecanismo de acción
El Ácido Fusídico inhibe la síntesis proteica de las bacterias sensibles, al impedir la translocación de los aminoácidos, durante la síntesis de las cadenas peptídicas; este efecto lo logra sin unirse al ribosoma, ocasionando el colapso de la pared celular.

INDICACIONES
Antibioterapia tópica de infecciones cutáneas húmedas o secas (exudativas, inflamatorias y escamosas), incluyendo profilaxis posquirúrgica y dermopatías bacterianas.
Farmacología clínica
Absorción: El Ácido Fusídico penetra en la piel intacta hasta en 2% de la dosis aplicada. En la capa córnea dañada la concentración alcanza hasta 100-150 mcg/mL, cuando se encuentra intacta la concentración alcanza 0,8 mcg/mL. Se ha encontrado que después de 16 horas de su aplicación, se pudo remover sólo 80% del Ácido Fusídico, lo cual indica que 10-20% penetra en la piel.
Distribución: Más de 95% del Ácido Fusídico viaja unido a proteínas y es ampliamente distribuido en todo el organismo; ha sido encontrado en la circulación fetal y en la leche materna.
Metabolismo: Es metabolizado a nivel hepático hacia metabolitos con pobre actividad farmacológica.
Eliminación: Su vida media sérica es de 5-6 horas y su excreción es lenta, principalmente por vía biliar.
Espectro antimicrobiano
El Ácido Fusídico es muy activo contra el estafilococo y notablemente contra el S. aureus y S. epidermidis, incluyendo las cepas meticilino resistentes. Las cepas de Nocardia asteroides y algunas de Clostridium spp. son también altamente susceptibles; igualmente es activo frente a Propionibacterium acnes y Corynebacterium minutissimum. Los estreptococos y enterococos son menos susceptibles. Los hongos son resistentes al igual que la mayoría de las bacterias Gram (–) pero el Ácido Fusídico es moderadamente activo contra Neisseria spp. y Bacteroides fragilis.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS
Está contraindicado en pacientes que hayan presentado reacciones de hipersensibilidad al principio activo o algunos de sus componentes. No se debe usar en infecciones cutáneas virales, micóticas u ocasionadas por microorganismos no susceptibles, especialmente Pseudomonas aeruginosa.

PRECAUCIONES
Para la aplicación del Ácido Fusídico en cualquier lesión dermatológica profunda con drenaje quirúrgico, se deberá realizar con la mayor asepsia posible. En caso de ser utilizado en lesiones faciales, se debe evitar que el medicamento penetre a los ojos, debido a que puede causar irritación ocular.

POSOLOGÍA
Previo lavado y/o cura de las áreas comprometidas, aplique 2 a 3 veces por día, durante 7 a 10 días. Puede utilizarse vendaje protector.
En el acné, y según la lesión, puede utilizarse durante más tiempo.

REACCIONES ADVERSA
Regularmente es bien tolerado. Han sido reportadas escasas reacciones de hipersensibilidad. En menos del 1% de los casos se presenta prurito, irritación y eritema en el sitio de aplicación.

INTERACCIONES FARMACOLOGÍCAS
Aunque no se conoce bien la ruta metabólica del Ácido Fusídico, se cree que los fármacos que interfieran con la CYP3A4 del citocromo P-450, deben evitarse durante la terapia. Al ser administrado simultáneamente con saquinavir, ritonavir y estavudina, se ha detectado un aumento de sus concentraciones plasmáticas.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Uso bajo criterio facultativo.

PRESENTACIÓN
Tubo con 15 gramos.

Fusidex M

Acido Fusídico + Mometasona

Antibiótico Tópico / Esteroide Tópico.

COMPOSICIÓN
Cada gramo de crema contiene:
Ácido fusídico al 2 %
Furoato de mometasona al 0,05 %
Excipientes, c.s.p.

DESCRIPCIÓN
Es la combinación de un antibiótico tópico, el ácido fusídico, y un esteroide no fluorado de potencia intermedia, el furoato de mometasona.

INDICACIONES
Afecciones dermatológicas inflamatorias en las que existe o potencialmente pudiera aparecer infección bacteriana sobreañadida. Las dermatopatías inflamatorias incluyen eccemas atópicos, eccemas discoides, dermatitis seborreica, dermatitis por contacto, eccemas por estasis, liquen simple crónico, psoriasis, lupus eritematoso discoide, cicatrices cutáneas potencialmente queloideas.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes sensibles a los principios activos de la fórmula.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
De exclusivo uso tópico. Evite el contacto con los ojos.
Nota: Luego de aplicar esta crema no ocluya las áreas tratadas con esta.

MODO DE APLICACIÓN
Aplique una capa delgada de crema 2 veces por día.

PRESENTACIÓN
Tubo de 15 gramos.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en lugar fresco (entre los 20 a 25°C), seco y protegido de la luz.
Su venta requiere prescripción médica.

Elaborado por:

Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana.
www.labsued.com

Reg. Ind. No.
Reg. San. No.

® Marca registrada

Rev. 20/11/2013