metaplex

Capletas / Inyectable

COMPOSICIÓN
metaplex Capletas:
Cada capleta de liberación prolongada contiene:
Monohidrato de Tiamina (vitamina B1).....125 mg
Riboflavina granulada (95% vitamina B2).....125 mg
Niacinamida.....125 mg
Piridoxina HCl granulada (80.61% vitamina B6).....125 mg
Ácido fólico..... ..... 2000 mcg
Cianocobalamina (1% vitamina B12).....125 mcg
Biotina..... .....125 mcg
Pantotenato de Calcio (91.6 % ácido pantoténico).....125 mg
Bitartrato de colina, 90%..... 60 mg
Inositol, 95% granular..... 125 mg
PABA (ácido para-amino benzóico).....125 mg
Excipientes, c.s.p.....1 capleta

metaplex Inyectable:
Cada 1 mL contiene:
Monohidrato de Tiamina (vitamina B1).....10 mg
Riboflavina granulada (95% vitamina B2).....4 mg
Piridoxina HCl granulada (80.61% vitamina B6).....5 mg
D-Pantenol..... ..... 8.5 mg
Niacinamida.....50 mg
Alcohol benzílico.....1.5 v/v
Excipientes: c.s.p.

PROPIEDADES
Las vitaminas del grupo B contenidas en metaplex® representan elementos constitutivos de los sistemas enzimáticos que catalizan las reacciones del metabolismo glucídico, lipídico y protídico. Cada componente tiene importancia biológica específica.

INDICACIONES
metaplex Capletas:
Prevención de déficit secundario a vitaminas del complejo B, así como tratamiento por carencia de vitaminas de este grupo.
metaplex Inyectable:
Manejo coadyuvante de estados clínicos hipercatabólicos, terapias antibióticas prolongadas e intoxicaciones alimentarias, así como para el tratamiento de condiciones de origen neuropático (neuropatías diabéticas, neuropatías periféricas de origen tóxico e infeccioso, ciáticas, radiculitis, polineuropatías alcohólicas). También para el tratamiento de astenia, mialgias, lumbalgias y tortícolis.

CONTRAINDICACIONES
metaplex Capletas: Hipersensibilidad a componentes de la fórmula.
metaplex Inyectable: Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula. policitemia vera, lactancia, recién nacidos.

REACCIONES ADVERSAS
metaplex Capletas: Ninguna conocida.
metaplex Inyectable: La administración de este producto puede producir reacciones de hipersensibilidad como rash cutáneo, náusea, vómito y, en ocasiones, choque anafiláctico en personas susceptibles.

PRECAUCIONES
En caso de alergia o hipersensibilidad a componentes de la fórmula, se recomienda tomar las debidas precauciones.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA
Uso bajo criterio facultativo.

ADVERTENCIA
Para evitar sobreingesta vitamínica, se recomienda no consumir este producto en caso de estar consumiendo otras vitaminas.

DOSIS
metaplex capletas:
Administración profiláctica:
Adultos y niños mayores de 12 años: 1 capleta por día, por la vía oral.
Administración terapéutica: Adultos y adolescentes: 1 a 2 capletas por día, por la vía oral.
Ingerir las capletas sin masticar, con un poco de líquido o acompañadas de alimentos.
metaplex Inyectable:
Uso intramuscular: La dosis promedio recomendada es dos (2) cc por la vía intramuscular profunda en días alternos.
Uso en venoclisis: Se recomienda la dilución de cinco (5) cc de metaplex en 500 cc de solución dextrosa al 5% para ser administrada de acuerdo al estado hemodinámico del paciente.

PRESENTACIONES
metaplex capletas: Caja con 30 capletas.
metaplex Inyectable: Frasco con 10 mL.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.
Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Conserve en un lugar fresco (entre 15° y 25° C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES:
Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L.,
Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010

Elaborado por:

Laboratorios Sued, S.R.L.
Santo Domingo,
República Dominicana
www.labsued.com

Reg. Ind. No.18055.
Reg. San. No.
® Marca registrada.
Rev. 02/12/2014.