

propinox

gotas

INFORMACIÓN PARA PRESCRIBIR.

Antiespasmódico / Analgésico.

COMPOSICIÓN

Cada 1 mL (un gotero) contiene:

Propinoxato HCl..... 5 mg

Excipientes, c.s.p..... 1 mL

DESCRIPCIÓN

Propinox® es propinoxato. Un antiespasmódico con doble efecto sobre el músculo liso de las vísceras huecas. Con importantes acciones muscolotrópicas (96 veces superior a la papaverina), bloqueando probablemente el ingreso del ión calcio al interior de la célula muscular. Por otro lado, posee acción neurotrópicas (anticolinérgicas) al competir con la acetilcolina por su receptor muscarínico, pero con potencia 17 veces menor que la atropina. Anulando el espasmo doloroso, y permitiendo que el músculo liso recupere su tonicidad normal. Sin embargo, y a diferencia de los anticolinérgicos atropínicos, no bloquea significativamente la acción de la acetilcolina en otras áreas corporales inervadas por el Sistema Nervioso Parasimpático (suave acción neurotrópica), careciendo de efectos secundarios como sequedad bucal, midriasis, taquicardia, retención urinaria.

INDICACIONES

Cólicos intestinales en lactantes y niños con espasmos del tubo digestivo, colitis espásticas, colitis agudas, sigmoiditis, duodenitis y espasmo del píloro.

CONTRAINDICACIONES

Alergia a cualquier componente de la fórmula, antecedentes de asma, glaucoma, estenosis pilórica, hipertrofia prostática y miastenia gravis.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Debido a la posibilidad de efectos anticolinérgicos, especialmente en pacientes sensibles, o cuando se usan dosis elevadas de este medicamento, debe tenerse precaución en pacientes con predisposición a la obstrucción intestinal o urinaria. Los medicamentos con acción anticolinérgica pueden aumentar la frecuencia y la conducción cardíaca, por tal motivo, se recomienda administrarlos con cautela a personas con tirotoxicosis, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, estenosis mitral. También debe evitarse su uso en personas con reflujo gastroesofágico o hernia hiatal.

Uso geriátrico: Los pacientes ancianos pueden presentar mayor sensibilidad a los anticolinérgicos y mayor incidencia de efectos adversos (retención urinaria, estreñimiento, sequedad bucal, etc.).

REACCIONES ADVERSAS

En personas particularmente sensibles o tras la administración de dosis elevadas de propinoxato, pueden experimentar sequedad bucal, constipación, visión borrosa, palpitaciones o taquicardia. Más raramente y en pacientes con factores predisponentes: Retención urinaria, aumento de la presión intraocular, cansancio, disminución de la memoria.

USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA

Sólo debería emplearse durante el embarazo, si los beneficios potenciales resultan superiores a los eventuales riesgos. Se recomienda no administrarlo durante el primer trimestre del embarazo.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Administrar con precaución a pacientes que se encuentren recibiendo drogas anticolinérgicas u medicamentos que puedan presentar efectos anticolinérgicos (antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, quinidina, fenotiazinas, etc.). Los antidiarreicos absorbentes y los antiácidos pueden disminuir la absorción de los anticolinérgicos. El propinoxato puede producir disminución de la absorción de ketoconazol, itraconazol, diuréticos, hipotensores, corticoides, digoxina, fenitoína, litio, metotrexato, ácido acetilsalicílico, paracetamol, otros antiinflamatorios no esteroidales, suplementos de potasio, hipoglucemiantes orales (por ej.: clorpropamida, glibenclamida, tolbutamida), anticoagulantes, ácido valpróico, cefamandol, cefoperazona, cefotetan, ciclosporina, sales de oro y plicamicina.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral.

DOSIS

Salvo otra indicación del médico tratante, las dosis recomendadas son:

• Niños de 1 a 5 años: un cuarto de gotero (0.25 mL) cada 6 horas.

• Niños de 6 a 12 años: medio gotero (0.5 mL) cada 6 horas.

• Adultos y niños mayores de 12 años de edad: un gotero (1.0 mL) cada 6 horas.

SOBREDOSIS Y TRATAMIENTO

En caso de sobredosis e ingesta accidental, se recomienda inducir lavado gástrico, proteger el tracto gastrointestinal con inhibidores de bomba de protones, dar soporte hemodinámico y corregir los efectos colinérgicos que presente el paciente.

PRESENTACIÓN

Frasco con 20 mL, y gotero calibrado.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN

Producto medicinal.

Su venta requiere prescripción médica.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Conservar este producto a una temperatura inferior a los 22°C, si así lo desea, puede refrigerar.

ELABORADO POR

Laboratorios Sued, S.R.L.

Santo Domingo,

República Dominicana.

www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Reg. San. No.: 2003-1408

® Marca registrada.

Rev. 27/01/2015.