

Jarabe Balsámico

COMPOSICIÓN Pseudoefedrina Hcl Dextrometorfano Hbr Carbinoxamina maleato Bálsamo de Tolú Fyriniente	JARABE 60 mg 15 mg 4 mg c.s. 5 mJ	GOTAS 25 mg 4 mg 2 mg c.s.
Excipiente	5 mL	1 mL

DESCRIPCIÓN

SUTOX® en un producto con propiedades antitusivas, descongestionantes y antihistamínicas.

INDICACIONES

Manejo sintomático de estados gripales y síntomas asociados, como es la tos, la congestión nasal y bronquial, lagrimeos, estornudos, así como también, para el manejo de afecciones respiratorias como bronquitis aguda o crónica.

CONTRAINDICACIONES

Embarazo y lactancia, pacientes cardiópatas, hipertiróideos, consumidores de IMAO e insuficientes ventilatorios.

REACCIONES ADVERSAS

SUTOX® es generalmente bien tolerado, aunque en ocasiones suele ocurrir somnolencia, razón por la que debe tenerse especial cuidado en personas que requieran mantener un adecuado nivel de alerta y manejen vehículos o maquinarias.

PRECAUCIONES

PRECAUCIONES

La ingestión de alcohol o cualquier otro depresor del sistema nervioso debe ser evitada durante la administración de SUTOX®. Debe tenerse cautela en pacientes con asma bronquial, obstrucción del cuello de la vejiga, trastornos renales o hepatitis y glaucoma de ángulo cerrado. Los antihistaminicos tienen mayor probabilidad de causar mareos y sedación en pacientes de edad avanzada.

USO DURANTE EL EMBARAZO

No se recomienda su uso en estas etapas.

SOBREDOSIS

Los efectos de sobredosis son debidos a depresión sobre el sistema nervioso. La excitación es más probable en niños y ancianos. El tratamiento es sintomático y de sostén.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

SUTOX JARABE

Oral.

DOSIS

Las dosis recomendadas son como se muestra en las siguientes tablas: DOSIS

Niños menores de 2 años	Según criterio médico.
Niños de 2 a 6 años	Media cucharadita (2.5 mL) cada 6 horas.
Niños de 7 a 12 años	Una cucharadita (5 mL) cada 6 horas.
Adultos y niños mayores de 12 años	Dos cucharaditas (10 mL) cada 6 horas.
OUTOV COTIO	D0010

Niños de 1 a 3 meses 0.25 mL (medio) cada 6 horas 0.5 mL (medio gotero) cada 6 horas. 0.75 mL (tres cuartos de gotero) cada 6 horas. Niños de 7 a 9 m Niños de 10 a 18 meses 1.0 mL (un gotero lleno) cada 6 horas

Nota: No exceder más de 6 dosis en 24 horas.

PRESENTACIONES

SUTOX® Jarabe, frasco de 120 mL. SUTOX® Gotas, frasco de 30 mL con gotero calibrado.

Leyendas de Protección: Producto medicinal.

Nounte management de la lacance de los niños. Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Conserve en un lugar fresco (entre 150 y 250 C), seco y protegido de la luz.

INFORMACIONES ADICIONALES: Contacte la Dirección Médica Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUED, S.R.L., Tel.: (809) 682-4344 / Fax: (809) 686-1010

Elaborado por:



Laboratorios Sued, S.R.L. Santo Domingo, República Dominicana www labsued com

Reg. Ind. No.18055 Reg. San. No. Marca registrada. Rev. 11/05/12. Ind. No.18055.