



**termex**<sup>®</sup>  
Meclizina

*Comprimidos / Jarabe*

#### **COMPOSICIÓN**

TERMEX<sup>®</sup> Comprimidos:

Cada Comprimido contiene:

Clorhidrato de meclizina 25.0 mg.

TERMEX<sup>®</sup> Jarabe:

Cada 5 mL contienen:

Clorhidrato de meclizina 12.5 mg.

Excipiente c.s.p.

#### **DESCRIPCIÓN**

La meclizina contenida en este producto posee propiedades antihistamínicas y anticolinérgicas con efectividad particular en caso de náuseas y vómitos. La meclizina actúa sobre las estructuras periféricas del laberinto, órgano fundamental en la regulación del equilibrio.

#### **INDICACIONES**

Prevención y tratamiento de mareos, náuseas, vómitos y prevención de cinetosis.

#### **CONTRAINDICACIONES**

Hipersensibilidad a componentes de la fórmula.

#### **PRECAUCIONES**

No se recomienda utilizar este producto en pacientes con glaucoma e hipertrofia prostática. Los inhibidores de la MAO; pueden prolongar e intensificar los efectos anticolinérgicos de la meclizina. Se debe advertir la aparición de somnolencia en personas que operan maquinaria y/o conducen vehículos de motor.

#### **USO DURANTE EL EMBARAZO Y LA LACTANCIA**

El uso de este medicamento durante estas etapas queda bajo criterio del médico tratante.

#### **REACCIONES SECUNDARIAS Y ADVERSAS**

Ocasionalmente se puede provocar sueño, boca y mucosa nasal secas e hipotensión arterial. En casos esporádicos suele haber inquietud, nerviosismo e insomnio, principalmente en niños.

#### **INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO**

Puede intensificarse la efectividad somníferos, psicoestimulantes, anticolinérgicos, antiparkinsonianos, se deberá vigilar el uso de antibióticos ototóxicos y depresores del SNC.

#### **SOBREDOSIS E INGESTA ACCIDENTAL**

Ocasionalmente pueden aparecer sensación de sueño, síntomas de mareo, trastornos del movimiento voluntario, signos de boca seca, dilatación de pupilas, enrojecimiento de cara, raramente fiebre alucinaciones, dolor de cabeza y

#### **VÍA DE ADMINISTRACIÓN**

Oral.

#### **DOSIS**

TERMEX<sup>®</sup> Comprimidos:

Prevención de mareos cinetóticos: Tomar uno o dos Comprimidos 15 a 30 minutos antes de iniciar el viaje.

Tratamiento de trastornos laberínticos y vestibulares:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 8 horas, sin sobrepasar 4 comprimidos al día.

TERMEX<sup>®</sup> Jarabe:

Niños de 6 a 12 años: Media a una cucharadita de 5 mL cada 8 horas.

Adultos y niños mayores de 12 años: Una cucharadita cada 8 horas.

#### **PRESENTACIONES**

TERMEX<sup>®</sup> Comprimidos: Caja con 10 Comprimidos.

TERMEX<sup>®</sup> Jarabe: Frasco con 120 mL.

#### **LEYENDAS DE PROTECCIÓN**

*Producto medicinal.*

Venta bajo prescripción médica.

Mantener éste y todos los medicamentos, fuera del alcance de los niños.

Conservar en un lugar fresco (entre 15° y 30° C), seco y protegido de la luz.

#### **INFORMACIONES ADICIONALES**

Contacte la Dirección Médica de Laboratorios SUEDE, S.R.L.

Tel.: (809) 686-1150 / Fax: (809) 686-1010

**Elaborado por:**



**Laboratorios Sued, S.R.L.**

Santo Domingo,  
República Dominicana  
www.labsued.com

Reg. Ind. No.: 18055

Regs. Sans. No.:

®Marca registrada

Rev. 25/09/2014